

Fimose e freio curto: quando há indicação de avaliação médica

Por Cristiano Ricardo · Publicado em 15/10/2009

Explicações claras sobre a anatomia do prepúcio, dificuldades de retração e opções de tratamento.

Versão online e eventuais atualizações:

<https://farmaceutico.cristianoricardo.com/post/fimose-e-freio-curto-quando-ha-indicacao-de-avaliacao-medica>

A dificuldade para expor completamente a glândula ou a sensação de repuxamento durante a ereção são queixas frequentes que muitos homens sofrem em silêncio por vergonha.

Fimose verdadeira vs prepúcio aderente

A fimose ocorre quando o anel do prepúcio é muito estreito e impede a retração da pele sobre a glândula. Isso dificulta a higiene e pode causar dor no ato sexual.

Freio bálano-prepucial curto

O freio curto pode tensionar excessivamente na ereção e até sofrer pequenas fissuras ou sangramentos.

Tratamentos modernos e eficazes

Pomadas específicas prescritas pelo médico podem resolver muitos casos na adolescência. Quando necessário, procedimentos cirúrgicos simples como postectomia ou frenuloplastia resolvem o problema em definitivo.

Conteúdo educativo Dr. Cristiano · Farmácia Clínica e Saúde Preventiva.